

定期予防接種

ワクチン	予診票の使用可能期間	望ましい接種時期	回数	接種間隔	
B型肝炎	1歳未満	生後2ヶ月～9ヶ月未満	3回	1回目	
				2回目	1回目から27日以上の間隔をおく
				3回目	1回目から139日(19週6日)以上の間隔をおく
ロタウイルス	ロタリックス：生後6週～24週0日	初回接種は14週6日までに開始	2回	4週間以上の間隔をおく	
	ロタテック：生後6週～32週0日		3回		
小児用肺炎球菌	生後2ヶ月～5歳未満	【初回接種開始】 生後2ヶ月～7ヶ月未満 【追加接種】 1歳～1歳3ヶ月未満 (初回終了後、60日以上の間隔をおく)	接種開始年齢	生後2～7ヶ月未満	初回 3回(※) ※2回目接種が1歳を超えた場合、3回目は接種しない(追加接種は可) 追加 1回
				生後7ヶ月～1歳未満	初回 2回 追加 1回
				1～2歳未満	2回
				2～5歳未満	1回
				生後2ヶ月～7歳6ヶ月未満	【1期初回】 生後2ヶ月～7ヶ月未満 【1期追加】 1期初回(3回目)終了後、6ヶ月～18ヶ月の間隔をおく
5種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ)	生後2ヶ月～7歳6ヶ月未満	【1期初回】 生後2ヶ月～7ヶ月未満 【1期追加】 1期初回(3回目)終了後、6ヶ月～18ヶ月の間隔をおく	1期追加	1回	1期初回(3回目)終了後、6ヶ月以上の間隔をおく
			2種混合 (ジフテリア 破傷風)	11歳～13歳未満	11歳
BCG	1歳未満	生後5ヶ月～8ヶ月未満		1回	
麻しん風しん混合	【1期】 1歳～2歳未満	1歳～2歳未満		1回	
	【2期】 5歳～7歳未満で 小学校入学前の1年間	幼稚園・保育園の年長クラスに該当する年齢		1回	
水痘	1歳～3歳未満	【初回】 1歳～1歳3ヶ月未満	初回	1回 ※注意事項 水痘(水ぼうそう)にかかったことのある人は対象外となります	
		【追加】 初回接種終了後、6ヶ月～12か月の間隔をおく	追加	1回 初回終了後、3ヶ月以上の間隔をおく	
日本脳炎	生後6ヶ月～7歳6ヶ月未満	【1期初回】 3歳～4歳未満	1期初回	2回 6日以上の間隔をおく(標準的には6～28日)	
		【1期追加】 4歳～5歳未満 (初回(2回目)終了後、おおむね1年の間隔をおく)	1期追加	1回 1期初回(2回目)終了後、6ヶ月以上の間隔をおく(標準的にはおおむね1年)	
		【2期】 9歳～13歳未満	2期	1回	
HPVワクチン (子宮頸がん)	小学校6年生から高校1年生までの間にある女子	中学校1年生の女子		2回または3回 ※注意事項 ワクチンの種類によって接種間隔が異なります	

阿見町任意予防接種

ワクチン	予診票の使用可能期間	お勧めの接種時期	助成回数/接種間隔	助成額(公費負担額)	自己負担額
おたふくかぜ	1歳～4歳未満	1歳～3歳未満	1回(1回目のみ) ※注意事項 おたふくかぜにかかったことのある人は対象外となります	3,000円	接種料金から3,000円を引いた差額(接種料金は医療機関によって異なります)