

【令和8年度 定期予防接種】

| ワクチン | 予診票の使用可能期間 | 望ましい接種時期 | 回数 | 接種間隔 | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| B型肝炎 | 1歳未満 | 生後2ヶ月～9ヶ月未満 | 初回2回 | 1回目から27日以上の間隔をおく | |
| | | | 追加 | 1回目から139日(19週6日)以上の間隔をおく | |
| ロタウイルス | (1価)ロタリックス：生後6週0日～24週0日 (5価)ロタテック：生後6週0日～32週0日 | 初回接種は14週6日までに開始 | 2回 | 4週間以上の間隔をおく | |
| | 3回 | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | 生後2ヶ月～5歳未満 | 【初回接種開始】 生後2ヶ月～7ヶ月未満 【追加接種】 1歳～1歳3ヶ月未満 (初回終了後、60日以上の間隔をおく) | 接種開始年齢 生後2～7ヶ月未満 | 初回 3回(※) | 生後2歳未満の間に、27日以上の間隔をおく ※2回目接種が1歳を超えた場合、3回目は接種しない(追加接種は可) 追加 1回 初回終了後60日以上の間隔をおいて生後1歳以降 |
| | | | | 追加 1回 | |
| | | | 生後7ヶ月～1歳未満 | 初回 2回 | 生後2歳未満の間に、27日以上の間隔をおく 追加 1回 初回終了後60日以上の間隔をおいて生後1歳以降 |
| | | | | 追加 1回 | |
| | | | 1～2歳未満 | 2回 | 60日以上の間隔をおく |
| 2～5歳未満 | 1回 | | | | |
| 5種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ) | 生後2ヶ月～7歳6ヶ月未満 | 【1期初回】 生後2ヶ月～7ヶ月未満 【1期追加】 1期初回(3回目)終了後、 6ヶ月～18ヶ月の間隔をおく | 1期初回 | 3回 | 20日以上の間隔をおく(標準的には20～56日) |
| | | | 1期追加 | 1回 | 1期初回(3回目)終了後、6ヶ月以上の間隔をおく |
| 2種混合 (ジフテリア 破傷風) | 11歳～13歳未満 | 11歳 | | 1回 | |
| BCG | 1歳未満 | 生後5ヶ月～8ヶ月未満 | | 1回 | |
| 麻しん風しん 混合 | 【1期】 1歳～2歳未満 | 1歳～2歳未満 | | 1回 | |
| | 【2期】 5歳～7歳未満で 小学校入学前の1年間 | 幼稚園・保育園の年長 クラスに該当する年齢 | | 1回 【2期 令和8年度対象】 令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ | |
| 水痘 | 1歳～3歳未満 ※注意事項 水痘(水ぼうそう)にかかったことのある人は対象外となります | 【初回】 1歳～1歳3ヶ月未満 | 初回 | 1回 | |
| | | 【追加】 初回接種終了後、 6ヶ月～12か月の間隔をおく | 追加 | 1回 初回終了後、3ヶ月以上の間隔をおく | |

| ワクチン | 予診票の使用可能期間 | 望ましい接種時期 | 回数 | 接種間隔 | |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 日本脳炎 特例措置あり※ | 【1期】 生後6ヶ月～7歳6ヶ月未満 | 【1期初回】 3歳～4歳未満 | 1期初回 | 2回 | 6日以上の間隔をおく(標準的には6～28日) |
| | | 【1期追加】 4歳～5歳未満 (初回(2回目)終了後、 おおむね1年の間隔をおく) | 1期追加 | 1回 | 1期初回(2回目)終了後、6ヶ月以上の間隔をおく (標準的にはおおむね1年) |
| | 【2期】 9歳～13歳未満 | 【2期】 9歳 | 2期 | 1回 | |
| HPVワクチン (子宮頸がん) | 小学校6年生から高校1年生 までの間にある女子 H22年4月2日～H27年4月1日生 | 中学校1年生の女子 | | 【ワクチンの種類】：9価(シルガード9)のみ 【標準的な接種間隔】 ・2回接種：15歳の誕生日前日までに1回目の接種をした後、1回目から6か月あけて2回目を接種 ・3回接種：1回目から2か月あけて2回目を接種した後、1回目から6か月あけて3回目を接種 | |

【令和8年度 任意予防接種】

| ワクチン | 予診票の使用可能期間 | お勤めの接種時期 | 助成回数/接種間隔 |
|-----------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| おたふくかぜ | 1歳～4歳未満 | 1歳～3歳未満 | 1回(1回目のみ) ※注意事項 おたふくかぜにかかったことのある人は対象外となります |
| 小児インフルエンザ | 令和8年10月1日時点で 生後6ヶ月～中学3年生該当の者 | | 1回 /年 |