

定期予防接種

ワクチン	予診票の使用可能期間	望ましい接種時期	回数		接種間隔	
B型肝炎	1歳未満	生後2ヶ月～9ヶ月未満	3回	1回目		
				2回目	1回目から27日以上の間隔をおく	
				3回目	1回目から139日(19週6日)以上の間隔をおく	
ヒブ	生後2ヶ月～5歳未満	【初回接種開始】 生後2ヶ月～7ヶ月未満 【追加接種】 初回接種終了後、 7ヶ月～13ヶ月の間隔をおく	接種開始年齢	生後2～7ヶ月未満	初回 3回 追加 1回	生後1歳未満の間に、27日以上の間隔をおく 初回終了後7ヶ月以上の間隔をおく
				生後7ヶ月～1歳未満	初回 2回 追加 1回	生後1歳未満の間に、27日以上の間隔をおく 初回終了後7ヶ月以上の間隔をおく
				1～5歳未満	1回	
小児用肺炎球菌	生後2ヶ月～5歳未満	【初回接種開始】 生後2ヶ月～7ヶ月未満 【追加接種】 1歳～1歳3ヶ月未満 (初回終了後、 60日以上の間隔をおく)	接種開始年齢	生後2～7ヶ月未満	初回 3回(※) 追加 1回	生後2歳未満の間に、27日以上の間隔をおく ※2回目接種が1歳を超えた場合、3回目は接種しない(追加接種は可) 初回終了後60日以上の間隔をおいて生後1歳以降
				生後7ヶ月～1歳未満	初回 2回 追加 1回	生後2歳未満の間に、27日以上の間隔をおく 初回終了後60日以上の間隔をおいて生後1歳以降
				1～2歳未満	2回	60日以上の間隔をおく
				2～5歳未満	1回	
4種混合 <small>(ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ)</small>	生後3ヶ月～7歳6ヶ月未満	【1期初回】 生後3ヶ月～1歳未満 【1期追加】 1期初回(3回目)終了後、 12ヶ月～18ヶ月の間隔をおく	1期初回	3回	20日以上の間隔をおく(標準的には20～56日)	
			1期追加	1回	1期初回(3回目)終了後、6ヶ月以上	
2種混合 <small>(ジフテリア 破傷風)</small>	11歳～13歳未満	11歳			1回	
BCG	1歳未満	生後5ヶ月～8ヶ月未満			1回	
麻しん風しん 混合	【1期】 1歳～2歳未満	1歳～2歳未満			1回	
	【2期】 5歳～7歳未満で 小学校入学前の1年間	幼稚園・保育園の年長 クラスに該当する年齢			1回	
水痘	1歳～3歳未満	【初回】 1歳～1歳3ヶ月未満	初回	1回 ※注意事項 水痘(水ぼうそう)にかかったことのある人は対象外となります		
		【追加】 初回接種終了後、 6ヶ月～12か月の間隔をおく	追加	1回	初回終了後、3ヶ月以上の間隔をおく	
日本脳炎	【1期】 生後6ヶ月～7歳6ヶ月未満	【1期初回】 3歳～4歳未満	1期初回	2回	6日以上の間隔をおく(標準的には6～28日)	
		【1期追加】 4歳～5歳未満 (初回(2回目)終了後、 おおむね1年の間隔をおく)	1期追加	1回	1期初回(2回目)終了後、6ヶ月以上の間隔をおく (標準的にはおおむね1年)	
	【2期】 9歳～13歳未満	【2期】 9歳	2期	1回		