

予防接種後の副反応

発熱、頭痛、倦怠感、注射部位の発赤、腫れ、痛みなどの症状が出るがありますが、通常2～3日で消退します。まれではありますが、重大な副反応として、ショック、アナフィラキシー（じんましん、呼吸困難感など）が起こる場合もあります。この点をご理解いただいたうえで、個人の判断により接種を受けていただくようお願いします。

接種部位の異常反応や体調の変化があった場合には、医師にご相談ください。

<町内のインフルエンザ予防接種協力医療機関一覧>

- *各医療機関に直接ご予約ください。かかりつけ患者のみ対象の場合もあります。
- *各医療機関での接種費用については、直接医療機関へお問い合わせください。
- *ワクチンの入荷状況により予約がとりにくい場合があります。町内以外でも県内のほとんどの医療機関で予防接種を受けることができます。
- *ワクチンの在庫状況によっては、12月中で接種終了となる場合がありますので、ご了承ください。

医 療 機 関 名	住 所	電 話
阿見ぎばクリニック	鈴木4-170	888-8800
あみ小林クリニック	若栗1765-1	888-2200
阿見第一クリニック	中郷2-30-6	887-3511
あみ東クリニック	吉原2672-10	889-8870
あみ泌尿器科クリニック	本郷2-3-1	842-2200
市川ファミリークリニック	本郷1-2-1	843-3301
印南クリニック	荒川本郷1329-1	834-2222
かたやま耳鼻咽喉科	阿見2670-1	887-3349
さかえ医院	中央4-8-24	888-2662
滝沢医院	中郷2-1-3	888-3323
つじ耳鼻咽喉科クリニック	うずら野4-27-5	801-3387
東京医科大学茨城医療センター	中央3-20-1	887-1161
なるしま内科医院	本郷1-22-1	869-4820
脳と心のクリニック	南平台1-32-1	819-4047